

Red Centinela Sanitaria de Castilla y León. VIGIRA

Procedimiento de registro de las IRA en MEDORA y solicitud de análisis microbiológico

PROCESOS CLINICOS INCLUIDOS	CIE-10-ES
Amigdalitis aguda, no especificada	J03.90
Bronquiolitis aguda	J21.8
Bronquitis aguda	J20.3 a J20.9
Covid-19	U07.1
Faringitis aguda, no especificada	J02.9
Gripe debida a otros tipos de virus de la gripe identificados	J10
Gripe debida a otros tipos de virus de la gripe identificados con neumonía	J10.0
Gripe debida a virus de la gripe identificados	J09.X3, J09.X9
Gripe debida a virus de la gripe no identificado	J11.00, J11.1
Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	J22
Infecciones agudas del tracto respiratorio superior de localización múltiple o no especificada	J06.0, J06.9
Laringitis aguda obstructiva [crup] y epiglotitis aguda obstructiva	J05
Laringitis y traqueítis agudas	J04.0, J04.10, J04.2
Nasofaringitis aguda [resfriado común]	J00
(1) Neumonía bacteriana, no clasificable bajo otro concepto	J15.0, A48.1, J15.9
Neumonía debida a coronavirus asociado a SARS	J12.81
(1) Neumonía por Mycoplasma pneumoniae	J15.7
(1) Neumonía por Streptococcus pneumoniae, Neumonía por Haemophilus influenzae	J13, J14
Neumonía vírica, no clasificada bajo otro concepto	J12.0, J12.9
(1) Neumonía, microorganismo no especificado	J18.0
(1) Neumonía, microorganismo no especificado	J18.9
(2) Otros trastornos respiratorios especificados	J98.8
(1) Se mantienen en esta tabla las neumonías bacterianas para poder describir las neumonías adquiridas en la comunidad, que en una alta proporción son secundarias a una IRA de etiología vírica.	
(2) Se mantiene este código porque presentan una clara tendencia estacional.	

Definición de IRA

Comienzo súbito de la enfermedad (en los 7 días previos) de al menos uno de los siguientes síntomas respiratorios:
tos, dolor de garganta, disnea o rinitis/coriza

Y

Que el juicio clínico sea de un proceso infeccioso

Nota 1: Puede presentarse con o sin fiebre

Nota 2: Se entiende por comienzo súbito que los síntomas aparecen de manera rápida en menos de 12 horas.

Nota 3: Se entiende que la primera consulta (con el centinela o no) se realizó en los 7 primeros días desde el inicio de síntomas.

Criterios de Síndrome gripal (Influenza like illness)

Comienzo súbito de la enfermedad (en los 7 días previos) con al menos uno de los cuatro síntomas generales siguientes:
fiebre o febrícula, malestar general, cefalea o mialgia

Y

Al menos, uno de estos tres síntomas respiratorios:
tos, dolor de garganta o disnea

Criterios de COVID-19

Comienzo súbito de la enfermedad (en los 7 días previos) de uno de los siguientes síntomas:

fiebre, tos o disnea

Se deben considerar también los siguientes síntomas:

anosmia, ageusia, diarrea, vómitos y cefalea,

siempre que a juicio clínico el paciente sea sospechoso de COVID-19.

Claves para el registro de un proceso clínico de IRA

- No usar un Proceso Clínico abierto para incluir nuevos episodios de IRA.
- No abrir dos Procesos Clínicos para un mismo episodio..
- Anotar siempre la fecha de inicio del proceso clínico.
- No utilizar términos como Fiebre, Tos, Disnea, etc. para definir un proceso clínico, ya que estos casos no se cargan en el sistema de vigilancia y pueden originar inconsistencias con resultados de laboratorio positivo para un virus respiratorio del que no dispongamos del proceso clínico.

Selección de pacientes para la toma de MUESTRA DE SALUD PÚBLICA

- Se recogerán un **mínimo de 2 y un máximo de 4 MUESTRAS DE SALUD PÚBLICA por semana para remitir al LM.**
- Pacientes que consultan en los 5 días posteriores al inicio de los síntomas, para asegurar una carga viral adecuada.
- Se recogerán muestras de **los dos primeros pacientes que consulten en esa semana** independientemente de la edad y del tipo de proceso y hasta otras dos muestras de pacientes a lo largo del resto de la semana procurando variar la edad con respecto a los dos primeros.
- Utilizad la ETIQUETA AUTOADHESIVA ROSA para identificar muestra y volante como MUESTRA DE SALUD PÚBLICA-RED CENTINELA SANITARIA



1. Valorar proceso clínico de IRA



Sospecha de COVID-19

Síndrome gripal

Otros procesos IRA

2. Crear proceso clínico



Enfermedad por coronavirus
Neumonía por coronavirus

Síndrome gripal

- IRA sin una focalización evidente: el registrar como 'Infección respiratoria aguda' o 'infección aguda de vías respiratorias superiores'
- IRA con focalización: regístralo con cualquiera de los literales de la tabla CIE10

Declaración de caso individual obligatoria

3. Abrir proceso clínico

MUY IMPORTANTE. Verificar la 'Fecha de Inicio'. Cambiarla en su caso por la fecha de inicio del primer síntoma


4. Abrir Guías asistenciales

GUÍA DE INFECCION RESPIRATORIA AGUDA PARA RED CENTINELA

*Completar al menos los campos obligatorios y opcionalmente la información complementaria de síntomas y del paciente

5. Toma de MUESTRA DE SALUD PUBLICA

Si se hace un test rápido de Ag del SARS-CoV-2 o gripe, se debe tomar otro frotis para remitir en Medio de Transporte de Virus.



Identificar muestra y volante

6. Revisar resultado

SARS-COV-2 POSITIVO

Verificar que el proceso es Enf Coronavirus. Si no, CAMBIAR el proceso por Enf Coronavirus. NO ABRIR OTRO PROCESO

SARS-COV-2 NEGATIVO

Verificar que el proceso NO es Enf Coronavirus. Si se puso Coronavirus, CAMBIAR el proceso por otra IRA que se ajuste a los síntomas. NO ABRIR OTRO PROCESO

Cualquier otro resultado

MANTENER el diagnóstico original